

Etiqueta 1 litro

210 mm

ilersan 414

Nº Lote :

Fecha de fabricación: dd/mm/aaaa

Fecha de vencimiento: dd/mm/aaaa

09092024



COMPOSICIÓN

Glutaraldehido	14,0 g
N-alquil dimetil benzil cloruro de amonio	2,5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

SOLUCIÓN
PARA USO VETERINARIO

CONTENIDO NETO

1 L

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

ILERSAN 414 se aplica en una dosis única de 5 mL / L de agua, equivalente a una dilución de 1:200.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar ILERSAN 414, limpiar prolijamente las superficies a desinfectar. Diluir 5 mL de ILERSAN 414 en 1 L de agua. Utilizar aspersoras manuales o motorizadas. Aplicar la dilución de manera uniforme o por inmersión.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto veterinario de venta libre



INDICACIONES DE USO

Desinfectante de amplio espectro y acción inmediata, utilizado para controlar la contaminación por bacterias y virus presentes en la industria avícola y pecuaria.

ILERSAN 414 se recomienda para desinfectar incubadoras, nacedoras, vehículos de transporte, equipo avícola, sala de ordeño y otras instalaciones sometidas a desinfección frecuente.

RENDIMIENTO

Con 1 L de solución de ILERSAN 414 se desinfecta 4 m² de superficie. Respetar cuidadosamente el rendimiento de la solución desinfectante.

PRECAUCIONES

La manipulación del producto concentrado, en salvaguarda del usuario debe ceñirse estrictamente a las normas de seguridad industrial que se detallan a continuación: Evitar el contacto con los ojos, utilizar anteojos de seguridad. No ingerir el producto, evitar la inhalación de vapores. Evitar el contacto directo con la piel, utilizar guantes de goma y prendas protectoras. Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manipular el producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. Buscar atención médica. En caso de inhalación, llevar al paciente a un ambiente ventilado y buscar atención médica. En caso de ingestión, no inducir el vómito ni ingerir líquidos. Buscar atención médica inmediata.

Cambiarse de ropa si ésta ha estado en contacto directo con el producto concentrado. No descargar efluentes que contengan este producto en aguas superficiales, es tóxico para los peces. No aplicar ILERSAN 414 concentrado ni diluido sobre alimentos

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos y secos y a temperatura entre 15 °C - 30 °C. Proteger el producto del calor, humedad y luz solar. Mantener el envase bien cerrado.



ilerder

ILERSAN 414 es una marca registrada de Ilerder Perú S.A.
Fabricado por ANIMAL PHARM S.A. para Ilerder Perú S.A. Av. Nicolás Ayllón Nº 2925. El Agustino.

Distribuido por Ilerder Perú S.A.
RUC. 20100331285 Calle Dos Nº 199, Urb. Córpac . San Isidro, Lima 27 - Perú, Telf: (511) 626 8300

Profesional responsable:
M.V. Mauricio Arcelles Porras
C.M.V.P. Nº 5332

Todos los derechos reservados

Costa Rica : Reg. MAG Nº AV-7877

115 mm

Etiqueta 5 litros

210 mm

ilersan 414

Nº Lote :

Fecha de fabricación: dd/mm/aaaa

Fecha de vencimiento: dd/mm/aaaa
09092024



COMPOSICIÓN

Glutaraldehido	14,0 g
N-alquil dimetil benzil cloruro de amonio	2,5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

SOLUCIÓN
PARA USO VETERINARIO

CONTENIDO NETO

5 L

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

ILERSAN 414 se aplica en una dosis única de 5 mL / L de agua, equivalente a una dilución de 1:200.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar ILERSAN 414, limpiar prolijamente las superficies a desinfectar. Diluir 5 mL de ILERSAN 414 en 1 L de agua. Utilizar aspersoras manuales o motorizadas. Aplicar la dilución de manera uniforme o por inmersión.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto veterinario de venta libre



INDICACIONES DE USO

Desinfectante de amplio espectro y acción inmediata, utilizado para controlar la contaminación por bacterias y virus presentes en la industria avícola y pecuaria.

ILERSAN 414 se recomienda para desinfectar incubadoras, nacedoras, vehículos de transporte, equipo avícola, sala de ordeño y otras instalaciones sometidas a desinfección frecuente.

RENDIMIENTO

Con 1 L de solución de ILERSAN 414 se desinfecta 4 m² de superficie. Respetar cuidadosamente el rendimiento de la solución desinfectante.

PRECAUCIONES

La manipulación del producto concentrado, en salvaguarda del usuario debe ceñirse estrictamente a las normas de seguridad industrial que se detallan a continuación: Evitar el contacto con los ojos, utilizar anteojos de seguridad. No ingerir el producto, evitar la inhalación de vapores. Evitar el contacto directo con la piel, utilizar guantes de goma y prendas protectoras. Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manipular el producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. Buscar atención médica.
En caso de inhalación, llevar al paciente a un ambiente ventilado y buscar atención médica.
En caso de ingestión, no inducir el vómito ni ingerir líquidos. Buscar atención médica inmediata.

Cambiarse de ropa si ésta ha estado en contacto directo con el producto concentrado. No descargar efluentes que contengan este producto en aguas superficiales, es tóxico para los peces. No aplicar ILERSAN 414 concentrado, ni diluido en el alimento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos y secos y a temperatura entre 15 °C - 30 °C. Proteger el producto del calor, humedad y luz solar. Mantener el envase bien cerrado.



ILERSAN 414 es una marca registrada de ilender Perú S.A.
Fabricado por ANIMAL PHARM S.A. para ilender Perú S.A. Av. Nicolás Ayllón N° 2925. El Agustino.

Distribuido por ilender Perú S.A.
RUC. 20100331285 Calle Dos N° 199, Urb. Córpac, San Isidro, Lima 27 - Perú, Telf: (511) 626 8300

Profesional responsable:
M.V. Mauricio Arcelles Porras
C.M.V.P. N° 5332

Todos los derechos reservados.

Costa Rica : Reg. MAG N° AV-7877

115 mm

Etiqueta 20 litros

220 mm

ilersan 414



COMPOSICIÓN

Glutaraldehído	14,0 g
N-alquil dimetil benzil cloruro de amonio	2,5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

SOLUCIÓN PARA USO VETERINARIO



INDICACIONES DE USO

Desinfectante de amplio espectro y acción inmediata, utilizado para controlar la contaminación por bacterias y virus presentes en la industria avícola y pecuaria.

ILERSAN 414 se recomienda para desinfectar incubadoras, nacedoras, vehículos de transporte, equipo avícola, sala de ordeño y otras instalaciones sometidas a desinfección frecuente.

Primeros auxilios

En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. Buscar atención médica.
En caso de inhalación, llevar al paciente a un ambiente ventilado y buscar atención médica.
En caso de ingestión, no inducir el vómito ni ingerir líquidos. Buscar atención médica inmediata.



DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

ILERSAN 414 se aplica en una dosis única de 5 mL / L de agua, equivalente a una dilución de 1:200.

Modo de empleo

Antes de aplicar ILERSAN 414, limpiar prolijamente las superficies a desinfectar.

Diluir 5 mL de ILERSAN 414 en 1 L de agua.

Utilizar aspersoras manuales o motorizadas. Aplicar la dilución de manera uniforme o por inmersión.

RENDIMIENTO

Con 1 L de solución de ILERSAN 414 se desinfecta 4 m² de superficie.

Respetar cuidadosamente el rendimiento de la solución desinfectante.



PRECAUCIONES



La manipulación del producto concentrado, en salvaguarda del usuario debe ceñirse estrictamente a las normas de seguridad industrial que se detallan a continuación:

Evitar el contacto con los ojos, utilizar anteojos de seguridad.

No ingerir el producto, evitar la inhalación de vapores.

Evitar el contacto directo con la piel, utilizar guantes de goma y prendas protectoras.

Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manipular el producto.

Cambiarse de ropa si ésta ha estado en contacto directo con el producto concentrado.

No descargar efluentes que contengan este producto en aguas superficiales, es tóxico para los peces.

No aplicar ILERSAN 414 concentrado, ni diluido sobre alimentos.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO



Almacenar en lugares frescos y secos y a temperatura entre 15° C - 30° C.

Proteger el producto del calor, humedad y luz solar. Mantener el envase bien cerrado.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto veterinario de venta libre



Nº Lote :

Fecha de fabricación: dd/mm/aaaa

Fecha de vencimiento: dd/mm/aaaa

09092024

CONTENIDO NETO

20 L



ilender

ILERSAN 414 es una marca registrada de ilender Perú S.A.
Fabricado por ANIMAL PHARM S.A. para ilender Perú S.A. Av. Nicolás Ayllón N° 2925. El Agustino

Distribuido por ilender Perú S.A.
RUC 20100331285. Calle Dos N° 199, Urb. Córpac San Isidro, Lima 27 - Perú, Telf.: (511) 626 8300

Profesional Responsable:
M.V. Mauricio Arcelles Porras
C.M.V.P. 5332

Todos los derechos reservados.

Costa Rica : Reg. MAG N° AV-7877

160 mm

ilersan 414



COMPOSICIÓN

Glutaraldehído	14,0 g
N-alquil dimetil benzil cloruro de amonio	2,5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

SOLUCIÓN PARA USO VETERINARIO



INDICACIONES DE USO

Desinfectante de amplio espectro y acción inmediata, utilizado para controlar la contaminación por bacterias y virus presentes en la industria avícola y pecuaria.

ILERSAN 414 se recomienda para desinfectar incubadoras, nacedoras, vehículos de transporte, equipo avícola, sala de ordeño y otras instalaciones sometidas a desinfección frecuente.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. Buscar atención médica.
En caso de inhalación, llevar al paciente a un ambiente ventilado y buscar atención médica.
En caso de ingestión, no inducir el vómito ni ingerir líquidos. Buscar atención médica inmediata.



DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

ILERSAN 414 se aplica en una dosis única de 5 mL / L de agua, equivalente a una dilución de 1:200.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar ILERSAN 414, limpiar prolijamente las superficies a desinfectar.

Diluir 5 mL de ILERSAN 414 en 1 L de agua.

Utilizar aspersoras manuales o motorizadas. Aplicar la dilución de manera uniforme o por inmersión.

RENDIMIENTO

Con 1 L de solución de ILERSAN 414 se desinfecta 4 m² de superficie. Respetar cuidadosamente el rendimiento de la solución desinfectante.



PRECAUCIONES



La manipulación del producto concentrado, en salvaguarda del usuario debe ceñirse estrictamente a las normas de seguridad industrial que se detallan a continuación:

Evitar el contacto con los ojos, utilizar anteojos de seguridad.
No ingerir el producto, evitar la inhalación de vapores.
Evitar el contacto directo con la piel, utilizar guantes de goma y prendas protectoras.
Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manipular el producto.
Cambiar de ropa si ésta ha estado en contacto directo con el producto concentrado.
No descargar efluentes que contengan este producto en aguas superficiales, es tóxico para los peces.
No aplicar ILERSAN 414 concentrado, ni diluido sobre alimentos.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO



Almacenar en lugares frescos y secos y a temperatura entre 15 °C - 30 °C. Proteger el producto del calor, humedad y luz solar. Mantener el envase bien cerrado.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto veterinario de venta libre



ilerder

ILERSAN 414 es una marca registrada de Ilerder Perú S.A.
Fabricado por ANIMAL PHARM S.A. para Ilerder Perú S.A. Av. Nicolás Ayllón N° 2925, El Agustino.

Distribuido por Ilerder Perú S.A.
RUC. 20100331285. Calle Dos N° 199, Urb. Córpac, San Isidro, Lima 27 - Perú
Telf: (511) 626 8300

Profesional Responsable:
M.V. Mauricio Arcelles Porras
C.M.V.P. 5332

Todos los derechos reservados.

Costa Rica : Reg. MAG N° AV-7877

N° Lote :

Fecha de fabricación: dd/mm/aaaa

Fecha de vencimiento: dd/mm/aaaa

09092024

CONTENIDO NETO

200 L