

MEGLUXIN

Flunixin meglumina 5%, en solución inyectable

COMPOSICIÓN POR ML:

Flunixin (meglumina) 50 mg
Excipientes c.s.p.

INDICACIONES:

Bovinos: Indicado para el control de la inflamación aguda y control de la pirexia asociada con la enfermedad respiratoria bovina.

Equinos: Indicado para el alivio de la inflamación y el dolor asociados con los trastornos músculo-esqueléticos en estados agudos y crónicos, y para el alivio del dolor visceral asociado con el cólico.

Porcino: Indicado como ayuda en el tratamiento del síndrome de mastitis-metritis-agalaxia de las cerdas (MMA).

CONTRAINDICACIONES:

No usar en caso de existir signos de discrasias sanguíneas.

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

EFFECTOS SECUNDARIOS (FRECUENCIA Y GRAVEDAD):

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intravenosa en bóvidos y équidos.

Intramuscular en cerdos.

POSOLÓGIA:

Bovinos: Control de la inflamación aguda y control de la pirexia asociada con la enfermedad respiratoria bovina: 2,2 mg de flunixin (meglumina)/kg p.v. cada 24 horas durante un máximo de 3 días (equivalente a 0,44 ml de MEGLUXIN/10 kg p.v.).

Equinos: Alivio de la inflamación y el dolor asociados con los trastornos músculo-esqueléticos en estados agudos y crónicos: 1,1 mg de flunixin (meglumina)/kg p.v. cada 24 horas durante un máximo de 5 días (equivalente a 0,22 ml de MEGLUXIN/10 kg p.v.).

Alivio del dolor visceral asociado con el cólico: 1,1 mg de flunixin (meglumina)/kg p.v. (equivalente a 0,22 ml de MEGLUXIN/10 kg p.v.). El tratamiento se puede repetir 1 ó 2 veces si persisten los síntomas.

Porcinos: Tratamiento de síndrome metritis-mastitis-agalaxia en cerdas: 2,2 mg de flunixin (meglumina)/kg p.v. (equivalente a 0,44 ml de MEGLUXIN/10 kg p.v.). Puede administrarse una o dos inyecciones separadas por 12 horas.

El número de tratamientos (uno o dos) dependerá de la respuesta clínica obtenida.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Puede producir anorexia, diarrea, úlceras gástricas, hipoproteinemia y necrosis renal. En este caso, suspender el tratamiento y aplicar terapia sintomática.

También aparecen signos de incoordinación y ataxia.

INTERACCIONES:

No administrar de forma conjunta, o con una diferencia de menos de 24 horas, con otros antiinflamatorios no esteroideos.

Algunos AINES pueden unirse en gran medida a las proteínas plasmáticas y desplazar a otros fármacos con gran afinidad para unirse a estas, lo que puede originar efectos tóxicos. Esta interacción es importante para fármacos con un margen terapéutico estrecho: anticoagulantes orales, metotrexate y algunos anticonvulsivantes como la fenitoína.

Puede disminuir el efecto de algunos antihipertensores por inhibir la síntesis de prostaglandinas. Entre estos cabe destacar los diuréticos, IECA, ARA y B-bloqueantes.

Debe evitarse la administración simultánea de fármacos potencialmente nefrotóxicos, destacando entre ellos la ciclosporina.

Puede disminuir la eliminación renal de algunos fármacos incrementando su toxicidad, como ocurre con el metotrexate, aminoglucósidos y las sales de Li.

TIEMPO DE ESPERA:

Carne: **Bóvidos:** 1 día; **Cerdos:** 21 días. Leche: No precisa.

No administrar a équidos cuya carne esté destinada al consumo humano.

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

Evitar el contacto con la piel. Deben utilizarse guantes durante la aplicación. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua.

Las personas con hipersensibilidad conocida a los antiinflamatorios no esteroideos deberán evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el prospecto.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGROSUPLIDORES F.L., C.A.;

RIF: J-31353351-3

TELF.: (0241) 871.5377

CEL.: 0414-416.0140

SAN DIEGO-VALENCIA

e-mail: agrosupli@cantv.net

ASESOR TÉCNICO: JOSEFINA REYES T.

PRESENTACIÓN:

Frascos de 50 ml.

Frascos de 100 ml.

Frascos de 250 ml.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Reg. N°: INSAI2041PI33N072166

Venta bajo prescripción del Médico Veterinario
Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.

USO VETERINARIO

Fabricado por:

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com

