

## FICHA TÉCNICA

### CEPRAVIN®

USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

<b>FÓRMULA:</b>	Cada dosis, una jeringa por 3 gramos contiene: Cefalonium 250 mg Excipientes c.s.p. 3 g
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL:</b>	Caja con 20 jeringas de 3 g cada una.
<b>INDICACIONES:</b>	Tratamiento de rutina de la Vaca Seca, para tratar infecciones subclínicas. El producto es activo contra <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>Streptococcus dysgalactiae</i> , <i>Corynebacterium ulcerans</i> , <i>Arcanobacterium pyogenes</i> , <i>Streptococcus uberis</i> , <i>E. coli</i> , <i>Proteus spp</i> , <i>Klebsiella spp</i> y <i>Citrobacter spp</i> . Aplicar al momento de secar la vaca, para reducir el riesgo de mastitis que comúnmente ocurre al momento del parto.

FOTO DEL PRODUCTO

#### ESPECIES DESTINO:

Bovinos productores de leche (vacas secas).

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión intramamaria.

#### DESCRIPCIÓN:

Infusión intramamaria para tratamiento y prevención de mastitis durante el periodo seco

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar el contenido de una jeringa en el canal del pezón de cada cuarto, inmediatamente después del último ordeño de la lactancia. Antes de la aplicación el pezón debe ordeñarse completamente, limpiarse y desinfectarse.



1. Antes de la aplicación, el pezón debe ser completamente ordeñado, limpiado y desinfectado.



2. Retirar la tapa completamente sosteniendo el cilindro de la jeringa firmemente en una mano y con el dedo pulgar empujar la tapa hasta que caiga. Evitar contaminar la boquilla de la jeringa.



3. Aplicar en el canal del pezón de cada cuarto el contenido de una jeringa, inmediatamente después del último ordeño de la lactancia.



4. Después de la aplicación, es aconsejable sumergir el pezón en una preparación antiséptica, especialmente diseñada para este propósito

Cepravin Vaca Seca debe ser utilizado bajo supervisión veterinaria. Se recomienda realizar un antibiograma previo a su uso

#### CONTRAINDICACIONES:

No debe ser administrado en animales hipersensibles a los antibióticos de cefalosporina y otros antibióticos βlactámicos.

<b>PRECAUCIONES ESPECIALES:</b>	
<b><i>Precauciones para su uso en animales:</i></b>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<b><i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i></b>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<b><i>Precauciones de Almacenamiento:</i></b>	
Almacenar a temperaturas menores de 30°C. NO CONGELAR	
<b>PERIODO DE RETIRO:</b>	
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante las 96 horas siguientes al parto no debe darse al consumo humano. No debe usarse en vacas lactantes	
<b>PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:</b>	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b> <a href="https://www.msd-salud-animal.com.pa/">https://www.msd-salud-animal.com.pa/</a>	
<b>PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.</b>	
<b>CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.</b>	
<b>SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.</b>	
<b>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.</b>	
ELABORADO POR: Schering-Plough Santé Animale. Francia.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.