

## FICHA TÉCNICA

**IMIZOL®**

USO VETERINARIO

### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| FÓRMULA:                | Dipropionato de Imidocarb ... 121.15 mg<br>Excipientes c.s.p . ..... 1 ml   |
| PRESENTACIÓN COMERCIAL: | frascos de 10, 30, 40 y 100 ml.   |
| INDICACIONES:           | El Imizol inyectable contiene Imidocarb para el control de la Babesiosis en bovinos, equinos y caninos y para el control de la Anaplasmosis en bovinos. |

**FOTO DEL PRODUCTO**

ESPECIES DESTINO:

En bovinos, equinos, caninos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución inyectable

MECANISMO DE ACCIÓN:

Imizol es un antiprotozoario para el control de la Babesiosis en bovinos, equinos y caninos y para el control de la Anaplasmosis en bovinos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

El Imizol inyectable se puede administrar por inyección subcutánea o intramuscular.

Dosis según el peso vivo:

|         | BABESIOSIS     | ANAPLASMOSIS   | BABESIOSIS/<br>ANAPLASMOSIS |
|---------|----------------|----------------|-----------------------------|
|         | IMIZOL /100 kg | IMIZOL /100 kg | IMIZOL /100 kg              |
| BOVINOS | 1.0 mL         | 2.5 mL         | 2.5 mL                      |
| EQUINOS | 2.0 mL         |                |                             |
| CANINOS | 2.5* mL        |                |                             |

\* Es decir, 0.025 ml de Imizol/kg peso vivo (0.25 ml Imizol por 10 kilos de peso).

+ Esta recomendación es también aplicable a burros y mulas.

CONTRAINDICACIONES:

El Imizol no se deberá administrar intravenosamente.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

*Precauciones para su uso en animales:*

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

*Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):*

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

*Precauciones de Almacenamiento:*

Almacenar entre 2 - 8 °C y protéjase de la luz.

**PERÍODO DE RETIRO:**

La leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo no debe destinarse al consumo humano. Los animales destinados al consumo humano no deberán sacrificarse durante 213 días siguientes a la dosificación.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR:  
Vet Pharma Friesoythe GmbH  
Alemania.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL  
Bajo Licencia de Intervet International B.V.