

## Nicoccil®



### COMPOSICIÓN

Cada 100 g de **Nicoccil** contiene:

Maduramicina amonio *	0.86 g
Nicarbazina	8.0 g
Excipientes c.s.p.	100.0 g

(\*) Equivalente a maduramicina base 0.75 g

### Forma farmacéutica

El producto se presenta en forma de polvo homogéneo de color amarillo verdoso.



### INDICACIONES DE USO

**Nicoccil** posee un amplio espectro anticoccidial y es efectivo en el control de *Coccidia* que afectan la crianza de pollos de engorda: *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *E. mivati* y *E. maxima*.

La Nicarbazina es una droga de primera elección por su poderosa acción coccidiostática y porque impide la formación de cepas *Eimeria* - resistentes.

La Maduramicina es un coccidiostato de la serie de inhibidores de la bomba de potasio. La combinación de ambas drogas tienen efecto sinérgico y potencian la acción coccidiostática, disminuyendo el riesgo del uso de las drogas con respecto a su aplicación independiente.



### ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

**Nicoccil** está formulado para ser administrado vía oral en combinación con el alimento balanceado.



#### Aves

Pollos de engorde: 500 g de **Nicoccil** por tonelada de alimento. (equivalente a 40 ppm de Nicarbazina y 3,75 ppm de Maduramicina)

Administrar a las aves en forma continua desde el primer día de edad.



### CONTRAINDICACIONES

Ninguna.

## Hoja Técnica



### ADVERTENCIAS

Administrar solo a pollos de engorde.  
No administrar a otras especies animales.  
No exceda la dosis recomendada.  
No agregar otra droga anticoccidial al alimento.



### PERIODO DE RETIRO

Aves: 05 días antes del beneficio.



### PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO Y ALMACENAMIENTO



Se recomienda seguir las normas de seguridad industrial (uso de anteojos, guantes y mascarilla) durante la manipulación del producto.

Los operarios deben lavarse las manos con agua y jabón después de la manipulación del producto.

Si se produce un contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

Evitar usar el producto cerca de fuentes generadoras de fuego. El producto deberá ser almacenado en lugares frescos, secos y a temperatura entre 15°C-30°C. Proteger de la humedad, calor y luz solar directa. Mantener el envase bien cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO



### PRESENTACIÓN

**Nicoccil** se encuentra disponible en la presentación de: Saco por 25 kg.

**Nicoccil** es una marca registrada por ilender Perú S.A.  
Fabricado y distribuido por ilender Perú S.A.  
Calle Dos N° 199, Urb. Córpac, San Isidro, Lima 27 - Perú.  
Telf. (51 1) 626 8300 Fax: (51 1) 212 2027

[www.ilendercorp.com](http://www.ilendercorp.com)

**Todos los derechos reservados**  
Perú : Reg. SENASA N° F.64.20.N.0005